



DEUTSCHLANDS APFELSORTEN.

ILLUSTRIRTE, SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG
DER IM GEBIETE DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
GEBAUETEN APFELSORTEN.

HERAUSGEGEBEN
IM
AUFTRAGE UND UNTER MITWIRKUNG
DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
VON
DESSEN ERSTEM VORSTANDE


DR. TH. ENGELBRECHT,

Geh. Med.-Rath und Professor in Braunschweig.

HOLZSCHNITTE NACH ZEICHNUNGEN DES VERFASSERS ANGEFERTIGT VON
ALBERT PROBST.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1889.



204. Mantuaner (Mader) fast 00!††, Ende November bis Februar, März.

Die werthvollsten Obstsorten für Süd-Tirol, p. 2. — Kalterer Böhmer ebendasselbst.

Gestalt 78:54 — 55, flachrund mittelbauch. Hälften gleich.

Kelch geschlossen, grün und braun, bewollt. Blättchen mittelbreit, am Grunde sich berührend, ziemlich lang, nach innen geneigt, aufrecht oder etwas nach aussen gebogen. Einsenk. tief, etwas enge, zwischen flachen, breit zum Bauche laufenden Rippen. Querschn. etwas flachkantig.

Stiel holzig, dünn, etwa 16 mm l., meist bräunlich, wenig behaart. Höhle mitteltief, mittelweit, fast eben, nicht weithin zart hellbraun berostet.

Schale glatt, geschmeidig, fast fettig, glänzend, hellgrünlichgelb, später gelb, fast wachsartig gelb, sonnenw. leuchtend carmoisinroth überzogen, nicht oder undeutlich streifig. Punkte sparsam, recht fein, bräunlich, im Roth als gelbe Dupfen erscheinend. Welkt nicht. Geruch merklich.

Kernhaus 33:26; zwiebelf. Kammern 9:16, an beiden Enden spitz, oder kelchw. sehr wenig abgestumpft, glattwandig, mittelgeräumig, nicht oder wenig offen. Achsenh. schmal. Kerne zu 1 bis 2, mittelgross, meistens vollkommen, eiförmig, gespitzt, braun.

Kelchhöhle abgestumpfter Kegel, $\frac{1}{2}$ zur Achsenh. Pistille lang bis mittellang verwachsen, fast kahl. Staubfäden mittelständ.

Fleisch hellgelblichweiss, fast weiss, fein, mürbe, zart, saftig, edel rosenapfelartig gewürzt, wenig vorherrschend, mild weinig, nicht viel weniger süß.

Die Früchte erhielt ich von Mader-St. Michele in Tirol.