



Obstsortendatenbank

Quelle:

DEUTSCHLANDS APFELSORTEN.

ILLUSTRIRTE, SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG
DER IM GEBIETE DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
GEBAUETEN APFELSORTEN.

HERAUSGEGEBEN
IM
AUFTRAGE UND UNTER MITWIRKUNG
DES
DEUTSCHEN POMOLOGEN-VEREINS
VON
DESSEN ERSTEM VORSTANDE


DR. TH. ENGELBRECHT,

Geb. Med. - Rath und Professor in Braunschweig.

HOLZSCHNITTE NACH ZEICHNUNGEN DES VERFASSERS ANGEFERTIGT VON
ALBERT PROBST.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1889.



557. Zimmt-Reinette (Diel) fast 00!† December bis April.

Diel XX, p. 165.

Gestalt 57:45, abgestumpft rundlich, mittelbauch. Hälften gleich.

Kelch offen, grün und braun, fast kahl. Blättchen mässig breit, am Grunde meistens getrennt, lang, aufrecht und nach aussen gebogen, fein gespitzt. Einsenk. ziemlich tief, mittelweit, fast eben, oder sehr schwach faltig. Querschn. rund.

Stiel holzig, dünn, etwa 14 mm lang, oft kürzer und dicker, braun, locker behaart. Höhle ziemlich tief, mittelweit, eben, grün, schwach berostet.

Schale rauh, grün, später lebhaft grüngelb. Punkte undeutlich, da fast die ganze Oberfläche mit zimmtbraunem, kelchw. feinmaschigem, stielw. mehr feinschuppigem Roste bedeckt ist. Welkt meistens merklich. Geruch fehlt.

Kernhaus 28:22, zwiebelf. Kammern 8 bis 9:13, stielw. stumpf gespitzt, kelchw. abgerundet, glattwandig, ziemlich geräumig, geschlossen. Achsenh. nur angedeutet. Kerne meistens zu zwei, mässig gross, vollkommen, länglich eiförmig, gespitzt, kastanienbraun.

Kelchhöhle kegelförmig, fast $\frac{1}{2}$ zur Achsenh. Pistille lang verwachsen, nur in der Theilung etwas flaumig. Staubfäden wenig unter mittelstünd.

Fleisch hell grünlichgelb, fein, markig, wenig schwammig, saftig, edel und kräftig, etwas zimmtartig gewürzt, etwas vorherrschend, angenehm wenig, fast ebenso süss.

Die Früchte erhielt ich aus der Landes-Baumschule-Braunschweig, Reis von Diel-Oberdieck.